


jeudi 11 mai 2023  
n°9

# #HERBE&FOURRAGES

## COURBE DE POUSSE DE L'HERBE EN LORRAINE



## FAUCHEUSES DANS LES STARTING-BLOCKS !


## LA COUVERTURE DES BESOINS PAR L'HERBE SELON LE CHARGEMENT

Pousse kg MS/j/Ha	30 ares/UGB	40 ares/UGB	50 ares/UGB	60 ares/UGB
15	29%	38%	48%	57%
35	67%	89%	111%	134%
55	105%	140%	175%	210%
75	143%	191%	239%	287%
95	182%	242%	303%	363%
115	220%	293%	366%	439%

### Exemple d'interprétation :

Une pousse de l'herbe de **55 Kg MS/ha/j**, permet de couvrir la totalité des besoins pour des pâtures avec chargement de **30 ares/UGB** !

La croissance médiane des sites lorrains est de **76 Kg MS/ha/j**.



- Parcèle suivie
- \* pas de mesure cette semaine
- > hauteur d'herbe trop haute mesure non prise en compte

## CARTE DES SITES SUIVIS EN LORRAINE EN 2023

### CROISSANCE MÉDIANE PAR SITE (KG DE MATIÈRE SÈCHE PAR HA ET PAR JOUR)

## CONTACTS

**CDA 57** - Céline Zanetti

**Arvalis** - Aurélien Jomier

**CDA 54** - Amélie Boulanger

**CDA 55** - Fanny Mesot & Tania Korner

**CDA 88** - Damien Godfroy & Mélanie Biot

**3CE** - Didier Deleau **Agrivair** - Adrien Estevez

**Animation du réseau - CRAGE** - Natacha KOZAK


natacha.kozak@grandest.chambagri.fr - 06 03 65 83 81

Source : données de l'observatoire de la pousse de l'herbe Grand Est - Chambres d'Agriculture du Grand Est, Arvalis-institut du végétal, AgriVair, Lycée agricole de Pixerecourt & le lycée agricole de Château-Salins

jeudi 11 mai 2023  
n°9

# #HERBE&FOURRAGES

## DES REPÈRES POUR LA CONDUITE DE PRAIRIE



## CÔTÉ MÉTÉO

Un cumul d'environ 750° jours depuis le 01 février est observé sur les stations lorraines. Pour la pluviométrie, en moyenne 10 mm sur la semaine passée, sans compter toute l'eau reçue depuis ce début de semaine...

## COMMENTAIRES

La semaine passée, les averses et orages ont été assez localisés d'après les cumuls de pluviométrie. Les 700 degrés jours ont été dépassés et c'était le bon créneau pour réaliser les fauches précoces afin d'avoir une qualité optimale. Même si le fourrage est humide, il fallait prendre le créneau et les valeurs alimentaires ne seront pas trop impactées. En effet, soit vous n'aviez qu'une petite averse dans votre secteur et le fourrage restera de qualité, soit la perte de valeur suite à une grosse averse ne sera pas plus importante que celle qu'il va y avoir en fauchant 15 jours plus tard dans de meilleures conditions (surtout si vous avez besoin d'un fourrage riche en énergie). Si les fauches précoces n'ont pas été faites la semaine passée, les graminées vont épier et la qualité du fourrage va diminuer rapidement, il faut donc faucher dès que possible. Cette fauche permettra également de profiter pleinement des pluies annoncées et de réaliser une 2ème coupe avant la période estivale.

Pour la gestion du pâturage, elle peut être difficile cette année. Les 2èmes tours commencent, les refus et les hauteurs d'herbe élevées sont bien visibles sur le terrain.

Si l'entrée au pâturage des animaux dépasse 10-12cm, préférez débrayer et faucher. Vous pouvez alors serrer davantage les animaux afin d'avoir une consommation d'herbe plus homogène.

## CONTACTS

**CDA 57** - Céline Zanetti

**Arvalis** - Aurélien Jomier

**CDA 54** - Amélie Boulanger

**CDA 55** - Fanny Mesot & Tania Korner

**CDA 88** - Damien Godfroy & Mélanie Biot

**3CE** - Didier Deleau **Agrivair** - Adrien Estevez