

MIEUX VALORISER SES PRAIRIES

Ne pas laisser d'herbe non exploitée

Des prairies mal valorisées

Les suivis menés par les réseaux d'élevage des Chambres d'Agriculture du Grand Est montrent **qu'une grande partie des surfaces en herbe est sous valorisée.**

En élevage allaitant, par exemple, c'est une parcelle sur deux qui est sous l'objectif de valorisation de 5,5 t MS/ha consommées par les animaux comme le montre le tableau ci-dessous.



Résultats de suivis
2012 et 2013

Exploitations bovines
viande en appui
technique

Valorisation de l'herbe (t MS/ha herbe)	< 5	5 à 5,5	5,5 à 6	6 à 6,5	> 6,5
Nombre d'exploitations	71	30	36	28	48
	33%	14%	17%	13%	23%

Voici quelques pistes pour tirer le meilleur parti de la production d'herbe de vos prairies.

Mieux gérer le pâturage

Sortir les animaux suffisamment tôt

Comme le montre le tableau comparatif ci-dessous, pour une prairie de qualité, mieux vaut favoriser le pâturage précoce.

Les effets du pâturage de printemps

Pâturage précoce

Améliore la flore
Favorise les espèces à cycle long
Bonne consommation des espèces à cycle court
Favorise le tallage

Pâturage tardif

Provoque des refus
Favorise les espèces précoces
Pénalise le tallage
Favorise le développement des adventices

Avoir un chargement suffisant au printemps

Un chargement trop faible au printemps induit des parcelles avec des refus, ce qui engendre une perte de productivité sur l'année. De plus, **resserrer les animaux au printemps** permet d'avoir plus de surface en 1^{ère} fauche de printemps.

Ces hectares supplémentaires de fauche vont permettre de produire des repousses servant à la pâture d'été souvent insuffisante.

Type d'animaux	Vaches laitières	Vaches allaitantes	Génisses 12 - 18 mois
Chargement (ares/UGB)	35 ares	40 ares	20 - 25 ares

Préconisations de chargement de printemps

➤ Eviter le surpâturage à l'automne

Bien nettoyer la parcelle à l'automne est important pour ne pas voir pourrir l'herbe pendant l'hiver. A l'inverse, attention à ne pas surpâture, sous peine de pénaliser la qualité de votre prairie.

Surpâturage et piétinement

Dégradation de la flore

Redémarrage plus lent au printemps suivant

Pénalise le renouvellement des racines à l'automne

Favorise le tallage des graminées

Favorise des espèces peu intéressantes et peu appétantes (fétuque rouge, pissenlit, plantain...)

Les effets du pâturage d'automne

Sous - Pâturage

Pourrissement de l'herbe pendant l'hiver

Des plantes malades provoquent des refus

Redémarrage plus difficile au printemps suivant

➤ Les points clés

Pour résumer, 5 règles à respecter pour bien gérer ses pâtures :


- Mettre à l'herbe tôt dès que le sol porte ;
- Pâture ras dès la mise à l'herbe et maintenir un chargement élevé au printemps. ;
- Ajuster la complémentation à la pousse de l'herbe ;
- Sortir à des hauteurs comprises entre 5 et 6 cm pour pâture le maximum d'herbe et limiter les refus ;
- Bien nettoyer les parcelles à l'automne tout en évitant le surpâturage.

Importance de la date de première utilisation

Une première exploitation trop tardive a pour conséquences :

- une perte de qualité car le stade est trop avancé,
- une repousse des espèces plus faible en été.

Certes, on récoltera plus de fourrage en quantité sur la première coupe, mais on observera un **impact négatif au global sur l'année**.



Pour avoir un fourrage de bonne qualité, le stade optimum est début épiaison. Au-delà, les valeurs alimentaires chutent !