

Tarissement et impact sur la reproduction : attention à ne pas faire d'impasses !

Les stocks alimentaires sont parfois bien différents cette année par rapport aux années passées et vont vous obliger à modifier le profil des rations distribuées aux animaux.

Certaines catégories d'animaux sont très sensibles à des déséquilibres alimentaires, c'est notamment le cas chez les vaches tarées. Nous avons parfois observé des rations déficitaires en énergie et protéines dans certains élevages, en particulier pour les vaches tarées en pâture cet été !

Un manque d'ingestion et d'énergie au tarissement aura pour conséquence une **augmentation des non délivrances, métrites, acétonémies** avec pour finalité une **baisse de la fertilité**.

A l'inverse, des rations trop riches en énergie favorisent l'engraissement avec un risque accru de vélages difficiles si la reprise d'état est supérieure à 0.5 point pendant le tarissement.

Les carences en protéines sont responsables de non délivrances et de métrites associés à une baisse de la fertilité. Dans certaines exploitations, le stock de foin est très limité et sera remplacé cet hiver par de la paille et du maïs ensilage pour les vaches tarées afin de maintenir les apports alimentaires et éviter les problèmes aux vélages (vélages difficiles, non délivrances, acétonémies...).

La réussite à l'IA est également conditionnée à la bonne alimentation des laitières pendant la phase de tarissement car la folliculogénèse, qui est l'ensemble des phases de croissance et de maturation des follicules aboutissant à la production de l'ovule, **se déroule sur de nombreuses semaines**.

Donc bien en amont de l'ovulation et de l'IA, la vache ne doit souffrir d'aucune carence.



Quelques propositions de rations avec de la paille

Début de tarissement

	Kg brut
Ensilage maïs	15
Paille	7
Tourteau 35 % MAS	2,5
Minéraux vaches tarées	150 g
Sel	60 g

Fin de tarissement

	Kg brut
Ensilage maïs	21
Paille	4,5
Tourteau 35 % MAS	3
Minéraux vaches tarées	150 g
Chlorure de Mg	100 g
Sel	60 g

Paille : privilégier une paille appétente type orge, coupée courte (4-5 cm), renouvelée tous les jours. Il est possible d'ajouter de l'aliment liquide pour favoriser l'appétence. Bien suivre la consommation de paille quotidiennement, toute baisse de l'ingestion doit alerter au risque de voir apparaître des problèmes sanitaires !

A la vue de l'hétérogénéité de la qualité des ensilages de maïs 2020, il est recommandé de les analyser avant de se lancer dans les calculs de ration.

Pour tous renseignements, contactez votre conseiller !

Le Groupe Expert Reproduction 3CE :

Moselle : Laurelie Martin et Cédric Gutzwiller

Alsace : Marc Fortmann

Haute Marne : Julien Homand