


mercredi 23 mars 2022
n°3

HERBE & FOURRAGES

COURBE DE POUSSE DE L'HERBE EN LORRAINE



PATIENCE DE RIGEUR MALGRÉ LES 300°C JOUR EN APPROCHE !

LA COUVERTURE DES BESOINS PAR L'HERBE SELON LE CHARGEMENT

Pousse kg MS/j/Ha	20 ares/UGB	30 ares/UGB	35 ares/UGB	40 ares/UGB
0	0%	0%	0%	0%
9	11%	17%	20%	23%
14	18%	27%	31%	36%
20	25%	38%	45%	51%
35	45%	67%	78%	89%

Exemple d'interprétation :


Une pousse de l'herbe de **9 Kg MS/ha/j**, permet de couvrir **23 %** des besoins pour des pâtures avec chargement de **40 ares/UGB**.

La croissance médiane des sites lorrains est de 9 Kg MS/ha/j

Le démarrage effectif tarde à arriver et certaines sites sont encore à l'arrêt.

Les températures plus chaudes de cette semaine vont sûrement aider.

"Tout vient à point à qui sait attendre !"



CARTE DES SITES SUIVIS EN LORRAINE EN 2022

COISSANCE MÉDIANE PAR SITE (KG DE MATIÈRE SÈCHE PAR HA ET PAR JOUR)

CONTACTS

CDA 55 - Fanny Mesot

CDA 57 - Céline Zanetti

CDA 54 - Amélie Boulanger

CDA 88 - Damien Godfroy & Mélanie Biot


Arvalis - Didier Deleau Agrivair - Adrien Estevez

Animation du réseau - CRAGE - Natacha KOZAK
natacha.kozak@grandest.chambagri.fr - 06 03 65 83 81

Source : données de l'observatoire de la pousse de l'herbe Grand Est - Chambres d'Agriculture du Grand Est, Arvalis-institut du végétal, AgriVair & le lycée agricole de Château-Salins

HERBE & FOURRAGES

DES REPÈRES POUR LA CONDUITE DE PRAIRIE



CÔTÉ MÉTÉO

Les 300°C jours (depuis le 1er février) sont atteints localement. Les autres sites se trouvent encore entre 250°C jours et 300°C jours. Côté pluviométrie, en moyenne 6mm sur la semaine dernière.

Températures douces annoncées mais sans pluie pour cette semaine..

COMMENTAIRES

Le redémarrage des prairies dépend de deux critères : la durée du jour et la somme des températures. Afin d'optimiser la gestion de l'herbe, les sommes de températures permettent de déterminer des repères d'exploitation.

Ces sommes de températures sont calculées à partir des relevés moyens journaliers. Le cumul de ces moyennes est réalisé à partir du 1er février. Toutes les moyennes inférieures à 0° sont lissées à 0°C et celles supérieures à 18°C sont bloquées.

Malgré le cumul des températures pratiquement atteint sur l'ensemble de nos stations, la hauteur n'y est pas. Nuits froides avec encore du gel, manque d'eau sur mars et vent pratiquement présent tous les jours, la hauteur d'herbe favorable au démarrage d'un réel pâturage des animaux n'est pas au rendez-vous.

La sortie générale n'est pas prévue pour le moment ! Si vous souhaitez nettoyer vos parcelles, faire plaisir à vos animaux, il est possible de lâcher sur les parcelles où la hauteur d'herbe est au minimum de 5-6 cm, soit de l'herbe jusqu'au talon de la botte.

PHOTO DE LA SEMAINE

Retour sur les conseils de la semaine passée : parcelle déprimée (fond) et non déprimée (devant) à Ceintrey (54)



Amélie Boulanger - CDA54

CONTACTS

CDA 55 - Fanny Mesot

CDA 57 - Céline Zanetti

CDA 54 - Amélie Boulanger

CDA 88 - Damien Godfroy & Mélanie Biot

Arvalis - Didier Deleau **Agrivair** - Adrien Estevez

Petit moyen mnémotechnique : hauteur de sortie minimale des animaux au printemps = N° du mois de l'année soit 3 cm en mars, 4 cm en avril et 5 cm en mai.

Source : R. DELAGARDE INRAe AFPP 2020