



ORGANISATION DES SURFACES FOURRAGERES																		
Parcelle	Superficie (ha)	Cultures	Espèces	CALENDRIER												DECISION		
				J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12			

Réaliser sa **prévision fourragère** avec son conseiller

Dès que la portance est de retour : **déprimer !**

=> **débuter dès que l'herbe atteint 8 cm pour les bovins et 5 cm pour les ovins**

=> **Arrêter à partir de 500 °C**

Temps de repos :
 21 jours au printemps
 35 jours en été
 40 jours en automne



Réussir son pâturage tournant dynamique en quelques points clefs

Repère d'entrée dans une parcelle : **Stade trois feuilles**



=> **Une herbe feuillue, de bonne qualité et qui a suffisamment reconstruit ses réserves**

=> **des performances animales conservées !**



Calculer ses **jours d'avance !**

=> **Donne une photo instantanée du stock d'herbe**


=> **Aide à prendre les bonnes décisions**

Limiter le temps de présence à **3 jours**

Repère de sortie d'une parcelle :
 Avant d'attaquer la gaine

=> **A ce stade, la plante a encore des réserves pour se régénérer**

=> **Il n'y a pas de retard de pousse ni de baisse de rendement**



Source PRAIRIALES Normandie du Robillard